

Sommergetreide für Futternutzung / Ackerfutter-Mischungen

- Anbaudaten -



Späteste Aussaat

Kultur	Wasserbedarf	Späteste Aussaat	Saatstärke kg/ha	Tage bis zur Ernte	Erntezeitpunkt	TM-Ertrag dt TM/ha	Überjährige Nutzung
Hafer		15.07.	400-450 Kö/m ²	110	Ende Milch-/Anfang Teigreife	50-85	
Sommertriticale		15.07	400-450 Kö/m ²	>110	Ende Milch-/Anfang Teigreife	80	
Sommergerste		30.07.	400-450 Kö/m ²	100	Ende Milch-/Anfang Teigreife	50-75	
A1 ³ /A1WZ ^{1,3} Welsches Weidelgras		10.08.	40-45	70	Beginn Ährenschieben	30-40 (Herbst)	x
A2 Einjähriges/Welsches Weidelgras		10.08.	40-45	50-70	Beginn Ährenschieben	30-40	(x)
A4 Einjähriges Weidelgras		10.08.	40	50-70	Beginn Ährenschieben	30-45	
A6 Einjähriges/Welsches Weidelgras/ Perser-/Alexandrinerklee		15.08.	30	70	Beginn Ährenschieben	25-35	
A5 ² Deutsches Weidelgras		15.09.	20-30	>100	Beginn Ährenschieben	15-25 (Herbst)	x
A3 ² Welsches/Bastard/ Deutsches Weidelgras		15.09.	20-40	>100	Beginn Ährenschieben	20-30 (Herbst)	x
Grünroggen ¹		15.10.	160-200	200-240	Schossen/Beginn Ährenschieben	50-70 Frühjahr	(x)









Wasserbedarf gering Wasserbedarf mittel Wasserbedarf hoch

Quelle: nach Arbeitsgemeinschaft norddt. LWK

¹ Winter-Zwischenfrucht ² als Zwischenfrucht ungeeignet ³ Siliereigenschaften im Herbst aufgrund niedrigem TS-Gehalt häufig eingeschränkt

Zwischenfrüchte für Futternutzung – Teil 1 - Anbaudaten -

Späteste Aussaat

Kultur		Späteste Aussaat	Saatstärke kg/ha	Tage bis zur Ernte	Erntezeitpunkt	TM-Ertrag dt TM/ha	Überjährige Nutzung
Markstammkohl ²		20.07.	3-4	100-160	beliebig	35-80	
Inkarnatklee ¹		30.07.	25-30	50-60	Beginn Blüte	20-30	x
Süßlupinen ²		05.08.	100-200	90-100	Vor der Blüte	15-30	
Einjähriges Weidelgras		10.08.	35-50	50-70	Beginn Ährenschieben	30-45	
Welsches Weidelgras ¹		10.08.	35-50	70-(240)	beliebig	30-40	x
Rauhafer		10.08.	80-120	60-100	Beginn Rispenschieben	30-40	
Perserklee		10.08.	15-20	70-100	Beginn Blüte	15-30	
Alexandrinerklee		10.08.	30-35	60-70	In Knospe	15-35	(x)

Quelle: nach Arbeitsgemeinschaft norddt. LWK



Wasserbedarf gering



Wasserbedarf mittel










Wasserbedarf hoch

¹ Sommer-Zwischenfrucht² in der Praxis kaum noch genutzt

Zwischenfrüchte für Futternutzung – Teil 2 - Anbaudaten -

Späteste Aussaat

Kultur		Späteste Aussaat	Saatstärke kg/ha	Tage bis zur Ernte	Erntezeitpunkt	TM-Ertrag dt TM/ha	Überjährige Nutzung
Stoppelrüben ²		10.08.	1-1,5	60-100	beliebig	45-60	
Sonnenblume ²		15.08.	20-30	60-80	Knospe bis Beginn Blüte	40-70	
Sommerraps ² / Winterrap ^{1,2}		20.08.	10-15	60-100	Vor Blüte bis Beginn Knospe	35-50/45	
Winterrüben ^{1,2}		20.08.	10-15	60-80	beliebig	30-50	
Ramtillkraut		20.08.	8-10	60-100	Knospe bis Beginn Blüte	25-35	
Sommerrüben ²		01.09.	10-15	50-70	Vor Blüte bis Beginn Knospe	30-40	

Quelle: nach Arbeitsgemeinschaft norddt. LWK



Wasserbedarf gering



Wasserbedarf mittel



Wasserbedarf hoch

¹ Sommer-Zwischenfrucht² in der Praxis kaum noch genutzt